LAVE-OEIL INDIVIDUEL STÉRILISÉ 50 ML. SOLUTION DIPHOTÉRINE
Référence : 24023

Livré avec un porte-ceinture nylon A porte sur soi. Intervention dans les 10 secondes. Contre une projection d'acide, de base ou de solvant.

FICHE TECHNIQUE

Solution de lavage d'urgence pour projections de substances chimiques sur l'oeil ou sur la peau. A PORTER SUR SOI.

Le LIS est un lave-oeil portatif, contenant 50ml de Diphotérine, destinés à un lavage de projection chimique dans les 10 premières secondes de l'oeil.

Le LIS est destiné à un premier lavage d'urgence.

Afin d'éviter le risque présenté par un lavage débuté au-delà des 10s., Il est recommandé lors d'un accident et de poursuivre le lavage au moyen des lave-oeils portatifs et muraux (500 ml) peut être utilisé en complément de la station murale, afin de poursuivre le lavage oculaire avec les lave-oeils portatifs et muraux (500 ml) ou de réaliser un lavage facial au moyen d'une MINI DAP (200 ml).

L'efficacité du LIS est permise par les propriétés actives de la Diphotérine

Il est recommandé lors d'un accident d'utiliser tout le contenu du LIS et de poursuivre le lavage au moyen des lav'oeils portatifs et muraux (500 ml)

- Recommandations générales :

- Le LIS doit être utilisé comme première solution en première intention ; l'utilisation préalable d'un lavage à l'eau entraîne le retard d'application et donc induit un risque d'efficacité réduite induite par la perte de temps.

- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur le conditionnement.

- Le LIS doit être utilisé comme solution de lavage : il ne doit pas donner lieu à un bain oculaire, mais bien à un lavage.

- Champ d'efficacité et limites connues de la Diphotérine

La Diphotérine permet de stopper la pénétration du produit chimique et l'évolution de toutes les brûlures chimiques, à l'exception des

LAVE-OEIL INDIVIDUEL STÉRILISÉ 50 ML. SOLUTION DIPHOTÉRINE
Référence : 24023

projections d'acide fluorhydrique et de ses dérivés sur lesquels elle a une action réduite. Il est dans ce cas spécialement recommandé d'utiliser l'Hexafluorine, solution de lavage des projections d'acide fluorhydrique et fluorés.

- Que faire si la brûlure est déjà apparue ou si j'interviens au-delà des 10 secondes ?

Au delà des 10 secondes, et en fonction du type de produit chimique, la brûlure peut déjà se développer. Un lavage, y compris sur une brûlure avérée, améliorera la mise en place des soins secondaires. La Diphotérine se révèle intéressante également dans les cas de lavage retardé (au delà des 60 secondes). Dans ce cas, nous recommandons de poursuivre le lavage initial réalisé avec un flacon de 500Ml de Diphotérine par un deuxième lavage d'une durée idéale de 5 minutes